

**Clinique Dentaire
Fréchette & Nadeau**
129, Notre-Dame est
Victoriaville, QC G6P 3Z8
Tél. : (819) 752-5579

Conseils post-opératoire pour implant

Après la chirurgie mettez de la glace 20-30 minutes chaque heure durant 12 heures. L'enflure provoquée par la chirurgie sera au maximum 2 à 3 jours suivant l'intervention et diminuera ensuite peu à peu. Il est normal que la zone puisse être colorée (ecchymose) pour plusieurs jours, surtout si vous avez tendance à faire des « bleus ». Prenez votre médication telle que prescrite. Évitez de jouer avec les points de sutures avec votre langue, de relever vos lèvres pour vérifier le site, de rire et de faire des mouvements qui tirent sur les incisions. Les points seront enlevés dans deux semaines. Il est normal que le saignement soit présent pour les premiers jours et que la salive soit rosée.

- **Implant avec prothèse**

Portez vos prothèses pour 24h afin de faire une compression sur le site et d'empêcher le saignement. Ensuite, il est recommandé de l'enlever pour la nettoyer et de la porter peu à peu selon votre confort et l'enflure. Les petits capuchons métalliques qui dépassent de votre gencive sont des piliers de guérison. Ils sont vissés sur les implants. Ceux-ci resteront en place le temps de la guérison et serviront à empêcher la gencive de recouvrir les implants. Donc, si vous devez enlever votre prothèse pour manger, évitez de mastiquer des aliments solides directement sur les piliers de guérison. Les implants ne sont pas encore guéris dans l'os et risquent d'être perdus si vous vous en servez comme des dents ! Si un des piliers se dévisse, communiquez avec nous. Les 2 premiers mois, il est conseillé de manger des aliments plus mous (pâtes alimentaires, omelettes, poisson, etc.) Aucune noix ou aliment semblable.

- **Implant unitaire**

Si des piliers de guérisons ont été vissés sur les implants (capuchon métallique qui dépasse de la gencive), évitez de mastiquer des aliments sur ceux-ci. Les implants ne sont pas encore guéris dans l'os et risquent d'être perdus si vous vous en servez comme des dents. Une fois les points de sutures enlevés, brossez-les avec une brosse à poils très souples afin de garder le site propre.

- **Grefe osseuse**

Afin d'éviter les particules osseuse de la greffe de se propager dans votre bouche, ne mastiquez jamais dans la zone greffée et évitez de broser avec la brosse à dent directement sur le site. Si toutefois vous sentez quelques particules les premiers jours, ne vous alarmez pas. Enlevez toujours votre partiel pour manger si vous en avez un car

il comprime la greffe et est souvent la cause d'échec. Nettoyez le site délicatement avec une coton tige imbibée de rince-bouche.